

## FASTAC® 10 EC

Conține: 100 g/l alfa-cipermetrin

Racemat (S)-ciano-3 fenoxi benzil (1R)-cis-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetil ciclopropan carboxilat și (R)-ciano-3 fenoxi benzil-(1S)-cis-3-(2,2-dicloro vinil)-2,2-dimetil ciclopropan carboxilat (pereche de 2 izomeri cis-ai cipermetrin)

Alți componenți periculoși: solvent nafta

Omologat cu Certificatul de omologare nr. 1058/29.02.1984

Insecticid

Formulare: concentrat emulsionabil

### Fraze de risc

R 10 – Inflamabil.

R 20/22 – Nociv prin inhalare și prin înghițire.

R 37/38 – Iritant pentru sistemul respirator și pentru piele.

R 41 – Risc de leziuni oculare grave.

R 43 – Poate provoca sensibilizare în contact cu pielea.

R 48/22 - Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătății la expunere prelungită prin înghițire.

R 65 – Nociv: poate provoca afecțiuni pulmonare în caz de înghițire.

R 67 – Inhalarea vaporilor poate provoca somnolență și amețală.

R 50/53 – Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

### Fraze de siguranță

S 2 – A nu se lăsa la îndemana copiilor.

S 13 – A se păstra departe de hrană, băuturi și hrana pentru animale.

S 20/21 – Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul folosirii.

S 24 – A se evita contactul cu pielea.

S 35 – A nu se arunca acest produs și ambalajul său decât după ce s-au luat toate precauțiile.

S 37– A se purta măști corespunzătoare.

S 57– A se utiliza un ambalaj (recipient) corespunzător pentru evitarea oricărei contaminări a mediului înconjurător.

S 62 - În caz de înghițire, a nu se provoca vomă: a se consulta imediat un medic și a se arăta ambalajul (recipientul) sau eticheta.

## e L

Lot. nr: vezi sus

Data fabricației: vezi sus

Termen de valabilitate: trei ani de la data fabricației

**Atenție:** Citește instrucțiunile alăturate înainte de utilizare. Pentru a evita riscurile pentru om și mediul înconjurător, se vor respecta instrucțiunile de utilizare.

**Producător și deținător al omologării:** BASF Agro B.V. Arnhem (NL) – Wadenswil Branch, Elveția

**Distribuitor:** BASF SRL România

Floreasca Business Park

Calea Floreasca nr. 169A, Clădirea B, Etaj 5

Sector 1, București, Cod Poștal: 014459

Departamentul Agro: Telefon: (004) 021 5299060, 5299065, 5299000

Fax: (004) 021 5299069, 5299099

**În atenția dumneavoastră:** Respectând indicațiile prezentate, insecticidul Fastac 10 EC poate fi utilizat în scopul propus. Producătorul își declină orice responsabilitate față de prejudiciile datorate depozitării, manipulării sau utilizării neconforme cu recomandările din această etichetă. Pentru lămuriri suplimentare vă puteți adresa Centrului de protecția plantelor, Unităților Fitosanitare Județene, sau reprezentanței BASF. ®= Marcă înregistrată a firmei BASF



X<sub>n</sub> (Nociv)



N (Periculos pentru mediu)

**FASTAC® 10 EC**

Conține: 100 g/l alfa-cipermetrin

Insecticid

**Proprietăți fizico-chimice:** Fastac 10 EC se prezintă sub formă de lichid limpede, omogen, mobil, de culoare galben-pai.

**Mod de acțiune:**

Fastac 10 EC este un insecticid, cu acțiune prin contact și ingestie asupra adulților și larvelor.

**Spectrul de activitate și mod de folosire:**

Fastac 10 EC se utilizează la culturile și în dozele conforme cu tabelul de mai jos:

<b>CULTURA</b>	<b>SPECTRUL COMBATERII</b>	<b>DOZA</b>
Grâu	<i>Eurygaster integriceps</i> <i>Haplodiplosis marginata</i>	0,1 l/ha
Cereale păioase	<i>Lema melanopa</i>	0,1 l/ha
Sfeclă de zahăr	<i>Mamestra brassicae</i> <i>Chaetocnema tibialis</i> (2 trat.) <i>Plusia gamma</i>	0,1 l/ha
Lucernă	<i>Phytodecta fornicata</i> <i>Sitona</i> spp. <i>Subcoccinella 24 punctata</i>	0,15 l/ha
Rapiță	<i>Melighetes aeneus</i>	0,075 l/ha
În	<i>Thrips linarius</i>	0,1 l/ha
Hamei	<i>Phorodon humuli</i>	0.02%
Cartof	<i>Leptinotarsa decemlineata</i>	0.1 l/ha
Tomate	<i>Leptinotarsa decemlineata</i>	0.01%
Legume	<i>Myzodes persicae</i> <i>Macrosiphon euphorbiae</i> <i>Thrips tabaci</i>	0.02%
Legume seră	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	0.02%
Măr	<i>Cydia (Carpocapsa) pomonella</i> <i>Nepticula malella</i> <i>Lithocolletis blancardella</i> <i>Leucoptera scitella</i> <i>Hoplocampa</i> spp. <i>Adoxophyes reticulana</i> <i>Lyonetia clerkella</i>	0.015%     0.008%
Păr	<i>Hoplocampa</i> spp.	0.015%
Prun	<i>Cydia (Laspeyresia) funebrana</i> <i>Eurytoma schreinerii</i> <i>Hoplocampa</i> spp.	0.015%
Piersic	<i>Anarsia lineatella</i> <i>Grapholita molesta</i> <i>Myzodes persicae</i>	0.015%  0.004%
Cireș	<i>Rhagoletis cerasi</i>	0.015%
Pomicultură	<i>Eriosoma lanigerum</i> <i>Malacosoma neustria</i> <i>Erannis defoliaria</i> <i>Operophtera brumata</i> <i>Orgyia antiqua</i>	0.02%    0.008%
Viță de vie	<i>Lobesia botrana</i>	0.075 l/ha

Silvicultură	<i>Cryptorrhynchus lapathi</i>	0.4 l/ha
Pomi fructiferi (Măr, Prun)	<i>Hyphantria cunea</i>	0.02%
Livezi pe rod și pepiniere	Afide	0.015%
Arbori	Omizi defoliatoare <i>Hyphantria cunea</i> <i>Lymantria dispar</i> <i>Euproctis chrysorrhoea</i>	0.02%
Tutun	<i>Myzus persicae</i> <i>Chloridae armigera</i>	0.2 l/ha
Rapita	<i>Athalia rosae</i>	0.2 l/ha

#### **Momentul aplicării:**

Fastac 10 EC se recomandă a se aplica la avertizare, la apariția larvelor sau adulților, sau la depășirea pragului economic de dăunare, funcție de dăunătorul țintă. Este foarte important ca produsul să fie aplicat astfel încât să se asigure acoperirea uniformă a plantelor cu soluție.

**Pregătirea soluției:** Se umple rezervorul mașinii de tratat până la jumătate, se adaugă cantitatea adecvată de produs, și apoi se completează cu restul de apă. Se va agita bine soluția de stropit în timpul umplerii și aplicării.

**Tehnica de aplicare:** Se pot folosi echipamente terestre pentru aplicarea în câmp sau în plantații horticole a produselor de protecția plantelor, utilizate în mod obișnuit la culturile sus menționate. Volumul de soluție utilizat este în funcție de echipamentul folosit. Se recomandă utilizarea volumului de soluție recomandat pentru fiecare cultură în parte.

**Notă:** Nu se va aplica pe terenuri adiacente cursurilor de apă. Să se prevină prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafață. Se impune respectarea măsurilor de protecție față de albine și zoofagi. Să fie atenționați crescătorii de albine în perioada efectuării tratamentelor.

**Compatibilitate:** Deși Fastac 10 EC poate fi amestecat direct în rezervor cu fungicide sau cu îngrășăminte lichide specifice, este recomandat să se procedeze la un test preliminar cu amestecul preconizat, pentru a observa aspectele fizice ale amestecului. Pentru o folosire corectă, consultați tabelele de compatibilități.

**Timp de pauză:** Vita de vie, Legume -7 zile, Rapita- 49 zile, Cartofi - 14 zile, Cereale - 42 zile, Tutun – 60 zile.

**Curățarea echipamentului:** Utilajele vor fi spălate cu jet de presiune, în zone special amenajate, prevăzute cu baze de inactivare a pesticidelor din apele de spălare.

**Măsuri de igiena și protecția muncii:** A se evita contactul cu pielea, ochii și îmbrăcămintea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecție. Păstrați separat îmbrăcămintea de lucru. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării. A se păstra ferit de produse alimentare, băuturi și produse furajere, semințe sau ambalajele acestora. Măinile și/sau fața trebuie să fie spălate înaintea pauzelor și la sfârșitul lucrului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor, persoanelor bolnave, femeilor gravide sau care alăptează, bătrânilor și altor persoane neautorizate, și în zonele de acces ale animalelor.

**Măsuri de prim ajutor:** Indepărtați imediat toate veștmintele contaminate. Dacă apar stări de rău consultați un medic. Ambalajul, eticheta și/sau fișa de siguranță a produsului trebuie prezentate medicului.

- după inhalare: țineți pacientul liniștit și duceți-l la aer proaspăt. Necesită asistență medicală imediată.

- după contactul cu pielea: se spală imediat cu apă și săpun. În caz de iritație cereți sfatul medicului.
- după contactul cu ochii: spălați imediat ochii afectați cel puțin 15 minute sub apă curgătoare cu pleoapele deschise; consultați un oftamolog.
- după ingerare: clătiți imediat gura și apoi beți multă apă, solicitați ajutor medical. Nu se va provoca vomă.

Indicații pentru medic: tratament simptomatic (decontaminare, funcții vitale).

**Antidot:** Nu se cunoaște un antidot specific.

**Măsuri de protecția mediului:** Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate produce efecte adverse pe termen lung în mediul acvatic. Nu se aplică pe terenurile agricole adiacente cursurilor de apă. Nu descărcați pe sol/în subsol. Nu goliți în canale de scurgere/ape de suprafață/ape subterane. Să se prevină prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafață. Se impune respectarea măsurilor de protecție față de albine și păsări.

**Eliminarea ambalajelor goale:** După golire ambalajele se clătesc de trei ori, iar apa rezultată se adaugă la soluția de stropit. Ambalajele inscripționate cu sigla SCAPA vor fi colectate gratuit prin centrele de colectare SCAPA. Telefonați la 0800.872.272- număr gratuit sau consultați [www.aiprom.ro](http://www.aiprom.ro). pentru informarea cu privire la cel mai apropiat centru de colectare și al calendarului de colectare SCAPA. Nu refolosiți ambalajele goale în alte scopuri.

**Măsuri de prevenire și stingere a incendiilor:** mijloace de stingere corespunzătoare: pulverizare de apă, ceață apoasă, dioxid de carbon, spumă. În caz de incendiu și/sau explozie nu respirați fumurile, păstrați recipientii reci prin pulverizare cu apă dacă sunt expuși la foc. A se purta echipamente cu respirație individuală și costum de protecție contra agenților chimici. Colectați separat apa de stingere; nu este permisă deversarea în sistemele de canalizare sau pluviale. Reziduul la combustie și apa de stingere contaminată vor fi îndepărtate conform reglementărilor în vigoare.

**Măsuri în caz de scurgeri sau pierderi accidentale:** pentru cantități mici: a se aduna cu material absorbant corespunzător (de ex. nisip, rumeguș, lianți universali, silicagel). Pentru cantități mari: a îndigui/a stăvili, a se pompa produsul. Îndepărtați materialul absorbit în acord cu reglementările în vigoare. Deșeurile trebuie strânse în containere corespunzătoare, etichetate și sigilate. Obiectele și pardoseala vor fi spălate bine cu apă și detergent, respectând normele de protecție a mediului înconjurător. Se va purta îmbrăcăminte de protecție individuală și aparate de respirație.

**Condiții de depozitare și transport:** Produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în încăperi uscate și ventilate, destinate în exclusivitate pentru pesticide, separat de produse alimentare, băuturi, țigări, furaje. Separat de oxidanți. Separat de baze tari. Produsul este combustibil. Vaporii pot crea un amestec inflamabil cu aerul. Să se prevină încărcarea electrostatică. A se feri de temperaturi sub 0°C. Produsul poate cristaliza dacă temperatura limită este depășită. A se feri de căldură și de acțiunea directă a razelor solare. A se feri de temperaturi mai mari decât 30°C. Caracteristicile produsului se pot modifica dacă acesta este depozitat mai multă vreme la temperaturi mai înalte decât cele indicate. Pe timpul manipulării, transportului și depozitării se vor lua măsurile de protecție a muncii, PSI, etc. În timpul transportului, produsul va fi protejat de intemperii și căldură.

**Termen de valabilitate:** În condițiile de depozitare și manipulare menționate, termenul de valabilitate este de trei ani de la data fabricației.

**In atenția utilizatorului:** Respectând indicațiile prezentate, insecticidul Fastac 10 EC poate fi utilizat în scopul propus. Producătorul își declină orice responsabilitate față de prejudiciile datorate depozitării, manipulării sau utilizării neconforme cu recomandările din această etichetă. Pentru lămuriri suplimentare vă puteți adresa Centrului de protecția plantelor, Unitatilor Fitosanitare Județene, sau reprezentanței BASF – BASF SRL București, Floreasca Business Park, Calea Floreasca nr.169A, Clădirea B, Etaj 5, Sector 1, București, tel. 021 5299061, fax. 021 5299069.

